

FICHE REFLEXE - Utilisation des masques et des gants

<p><u>Pourquoi mettre des gants à usage unique ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Si je fais un soin (gestes invasifs ou soin de vie courante) entraînant contact avec liquides biologiques (selles, sang, urines, liquides de la bouche ou du nez) • Pour le risque chimique d'un produit ménager / chimique 	<p><u>Quel est le risque de les porter en permanence ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixe les microbes sur les gants et favorise la contamination des autres surfaces • Auto-contamination <ul style="list-style-type: none"> ○ Si le retrait des gants est mal réalisé ○ Contact gants / autres parties du corps • Diminue naturellement la réalisation des gestes barrières car l'on se croit protégé • Durée limitée du port : 1 action = 1 soin = 1 geste de nettoyage = 1x... • Limitation du stock disponible
<p><u>Pourquoi mettre un masque chirurgical ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seulement pour protéger les autres : éviter la projection de ma salive ou excréctions respiratoires lorsque je présente des symptômes (toux, éternuements, fièvre, ...) 	<p><u>Quelles sont les limites des masques ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contamination de l'environnement par mauvaise manipulation ou lors du retrait • Auto contamination <ul style="list-style-type: none"> ○ Si le retrait du masque est mal réalisé ○ Contact masque / mains / autres parties du corps • Durée de vie de 4h à 8h (voir détails du fabricant) • Stock très réduit, ils doivent être économisés • Diminue naturellement la réalisation des gestes barrières (distances)
<p><u>Pourquoi mettre un masque FFP2 ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seulement pour me protéger lorsque je suis au contact rapproché (moins de 1 mètre) d'une personne symptomatique ou potentiellement contaminée : toux, éternuements, fièvre,... 	